刘琨毅,王利妍,安江珊,等.阿曲霉接菌发酵普洱茶的研究[J].轻工学报,2022,37(4):1-9.
LIU K Y, WANG L Y, AN J S, et al. Research on the fermentation of Pu-erh tea through inoculation with *Aspergillus amstelodami*[J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(4): 1-9. DOI: 10. 12187/2022. 04. 001

阿曲霉接菌发酵普洱茶的研究

刘琨毅^{1,2}, 王利妍¹, 安江珊¹, 罗慧¹, 王兴华^{1,3}, 马燕¹, 吕才有¹, 赵明¹

1. 云南农业大学 茶学院/食品科学技术学院/云南省药用植物生物学重点实验室/西南中药材种质创新与利用国家地方联合工程研究中心, 云南 昆明 650201;
2. 宜宾职业技术学院 五粮液技术与食品工程学院, 四川 宜宾 644003;
3. 普洱市茶叶科学研究所, 云南 普洱 665000

摘要: 将从普洱茶中分离鉴定到的阿曲霉 A1 (*Aspergillus amstelodami* A1) 接种于灭菌和未灭菌的晒青茶中, 分别进行纯菌发酵和强化发酵, 进而研究发酵茶样的感官特征、化学成分及微生物群落结构。结果表明, 纯菌发酵茶叶中的茶多酚和 5 种儿茶素含量均显著降低, 茶红素和茶褐素含量均显著增加; 与自然发酵茶样相比, 强化发酵茶样中的茶褐素和可溶性糖含量均显著升高, 而儿茶素、表儿茶素、表没食子儿茶素和咖啡碱含量均显著降低, 其干茶外形、汤色、滋味、香气和叶底感官审评分数均显著升高, 且茶汤的 a^* 值、 b^* 值升高, L^* 值降低; 阿曲霉 A1 虽不是强化发酵茶样的优势真菌, 但其改变了茶样中的微生物群落结构, 即通过与其他微生物协同作用, 阿曲霉 A1 发酵可改变茶叶的特征成分, 提高普洱茶的感官品质。

关键词: 普洱茶; 阿曲霉; 强化发酵; 茶叶化学成分; 微生物群落

中图分类号: TS272.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-1553(2022)04-0001-09

0 引言

云南普洱茶是我国特有的名茶, 其茶汤呈红褐色, 滋味醇厚回甘、陈香显著^[1]。据报道^[2-3], 普洱茶可以调节人体肠道微生物菌群, 具有抗高脂血症、抗氧化、抗肿瘤、预防糖尿病等多种保健功能。普洱茶独特的风味和保健功能主要归因于其发酵过程中的微生物作用^[4-5], 但在传统普洱茶自然发酵 (Natural Fermentation, NF) 过程中, 往往存在微生物来源复杂、不可控等因素, 从而导致其品质不稳定等问题^[6]。

强化发酵 (Enhanced Fermentation, EF) 是将一种或多种外源微生物接入未经灭菌的原料中进行发酵, 以提高发酵产品品质的技术^[7]。例如, 乳酸菌强化发酵红酸汤可以明显减少亚硝酸盐的含量^[8], 黑曲霉强化发酵普洱茶可改善普洱茶的感官品质^[9]。目前, 强化发酵技术在白酒^[10-11]、食醋^[12]等发酵食品生产过程中已有较广泛的应用, 并达到了提高发酵产品品质的目的, 但强化发酵技术在普洱茶生产过程中的应用及其对普洱茶微生物群落结构和化学成分的影响却鲜有报道。

阿曲霉 (*Aspergillus amstelodami*) 是一种能产纤

收稿日期: 2021-09-21; 修回日期: 2022-05-08

基金项目: 国家自然科学基金项目 (31760225, 32160728); 云南省高层次人才计划培养计划青年拔尖人才项目 (YNWR-QNBJ-2018-366); 国家现代农业茶叶产业体系专项资金项目 (CARS-19); 云南省科技厅科技计划项目 (202104BI090008)

作者简介: 刘琨毅 (1987—), 男, 四川省宜宾市人, 宜宾职业技术学院副教授, 云南农业大学博士研究生, 主要研究方向为普洱茶发酵。E-mail: 524449601@qq.com

通信作者: 赵明 (1979—), 男, 四川省绵阳市人, 云南农业大学教授, 博士, 主要研究方向为茶叶生物化学。E-mail: 624586076@qq.com

纤维素酶的真菌,对形成普洱茶的品质特征具有积极作用^[13]。谢晓晨等^[14]研究证实,阿曲霉是小青柑(一款普洱茶产品)的优势真菌。因此,将阿曲霉应用于普洱茶发酵不失为一种有益的探索,但接种阿曲霉发酵的普洱茶的感官特征、化学成分及微生物群落结构还需进一步研究,以探究该菌用于发酵普洱茶的可行性。

基于此,本研究拟将从普洱茶中分离获得的阿曲霉 A1 接种于灭菌和未灭菌的晒青茶中,分别进行普洱茶的纯菌发酵(Pure Fermentation, PF)和强化发酵,分析发酵茶样的感官特征、化学成分及微生物群落结构,以期获得一种提高普洱茶品质的有效方法,为高品质普洱茶的产业化生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 主要材料与试剂

晒青茶(选取一芽三叶的云南大叶种云抗 10 号茶树鲜叶,经摊放、杀青、揉捻、日光干燥至含水量低于 10%后制得),云南省普洱市茶叶科学研究所研制;儿茶素(C)、表儿茶素(EC)、没食子酸(GA)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表没食子儿茶素(EGC)、没食子儿茶素(GC)、儿茶素没食子酸酯(CG)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、咖啡碱(CA)、鞣花酸(EA)、杨梅素(MY)、木犀草素(LU)、槲皮素(QU)、山奈酚(KA)的标准品,成都曼思特生物科技有限公司产;马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基,青岛海博生物技术有限公司产;真菌 DNA 提取试剂盒、细菌 DNA 提取试剂盒,生工生物工程(上海)有限公司产;其余化学试剂均为国产分析纯。

1.2 主要仪器与设备

CP214 型电子分析天平,上海奥豪斯仪器有限公司产;756CRT 型紫外可见分光光度计,上海菁华科技仪器有限公司产;1200 型高速液相色谱,配有 TSKgel ODS-80TM 色谱柱(4.6 mm×250 mm×5 μm),美国安捷伦公司产;Trident 960 型基因扩增仪,上海力新仪器有限公司产;CT15RE 型离心机,日本日立公司产;SW-CJ-1B 型超净工作台,苏州安泰空气技术有限公司产;YS6060 型色差仪,深圳市

三恩时科技有限公司产。

1.3 实验方法

1.3.1 菌株的分离鉴定 从普洱茶(泾茯茶)中分离纯化得到菌株 A1,对其 ITS 序列进行 DNA 测序分析^[15],并进行系统发育树分析,以明确该菌株为阿曲霉。

1.3.2 阿曲霉 A1 菌悬液的制备 将阿曲霉 A1 接种于 PDA 培养基中,于 25 ℃ 条件下培养 7 d。用无菌生理盐水洗脱孢子,完成计数后,利用无菌生理盐水将孢子浓度调整至 1×10^7 CFU/mL,随后将 1 mL 孢子悬液接种至 100 mL 茶叶培养基中,于 25 ℃、120 r/min 条件下振荡培养 4 d,菌体计数后利用无菌生理盐水将菌体浓度调整至 1×10^7 CFU/mL,即得阿曲霉 A1 菌悬液。其中,茶叶培养基是用 2 L 蒸馏水于 100 ℃ 条件下浸泡 100 g 晒青茶 30 min,经 4 层纱布过滤后,于 121 ℃ 条件下灭菌 20 min 而成。

1.3.3 阿曲霉 A1 纯菌发酵普洱茶方法 称取 100 g 晒青茶(RM)置于 500 mL 三角瓶中,加入 40 mL 蒸馏水,湿热(121 ℃,20 min)灭菌,冷却后待用。将阿曲霉 A1 菌悬液接种于灭菌茶样中,于 28 ℃、相对湿度 60%的培养箱中发酵 20 d 后取出,于 -80 ℃ 贮藏待用,样品命名为 PF;将灭菌茶样不接菌,进行相同操作后作为对照样品(CK)。每组样品均进行 3 次重复发酵。

1.3.4 阿曲霉 A1 强化发酵普洱茶方法 在云南省普洱市茶叶科学研究所开展强化发酵普洱茶实验。称取晒青茶 25 kg 装入发酵筐中,加入 10 L 蒸馏水,再加入 250 mL 阿曲霉 A1 菌悬液,搅拌混匀后进行发酵,每隔 5 d 翻堆一次,25 d 后发酵完成。在每次翻堆前,采用五点取样法取样,样品于 -80 ℃ 贮藏待用,其中接种阿曲霉 A1 的翻堆样品依次命名为 EF1~5,自然发酵的样品(未接种阿曲霉 A1)依次命名为 NF1~5。每组样品均进行 3 次重复发酵。

1.3.5 茶叶化学成分测定及感官审评 参考 M. Zhao 等^[4]的方法,分别采用恒重法、福林酚比色法^[16]、茛三酮比色法、蒽酮法测定茶样水浸出物(Water Extracts, WE)、茶多酚(Tea Polyphenols, TP)、游离氨基酸(Free Amino Acids, FAA)及可溶性糖(Soluble Sugars, SS)含量;采用萃取比色法^[17]测

定茶样茶黄素(Theaflavins, TF)、茶红素(Thearubigins, TR)及茶褐素(Theabrownins, TB)含量;采用课题组建立的高效液相色谱法^[5](High Performance Liquid Chromatography, HPLC)定量分析茶样中的GA、CA、EA、QU、LU、KA、MY、C、EC、EGC、EGCG、EGCG、GC、GCG和CG含量。9位评茶员根据《茶叶感官审评方法》(GB/T 23776—2018)^[18]及胡圆圆等^[19]对普洱茶的感官审评方法,从干茶外形、汤色、香气、滋味和叶底5个项目对茶样进行专业审评,采用百分制评分,每5分为一档,2~3分为半档;将5个项目评分分别与其评分系数20%、15%、25%、30%、10%相乘,并将各个乘积值相加,即为该茶样感官审评的总分。同时利用色差仪对茶汤的颜色进行测定。

1.3.6 基于高通量测序进行微生物多样性分析 采用真菌DNA提取试剂盒、细菌DNA提取试剂盒分别提取接种阿曲霉A1普洱茶样品的真菌和细菌的DNA,应用DNA聚合酶(2×Rapid Taq Master Mix)进行聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)。其中,利用引物338F和806R扩增细菌16S rRNA的V3—V4区,以引物ITS5-1737F和ITS2-2043R扩增真菌ITS1的V2区。利用2%琼脂糖凝胶电泳检测PCR产物,并委托深圳微生态公司,应用Illumina MiSeq测序平台对PCR产物进行基因测序^[20]。应用QIIME 2.0软件对获得的序列按97%的相似度进行聚类 and OTU划分,计算群落丰度(ACE指数、Chao1指数)和Alpha多样性指数(Shannon指数和Simpson指数),评估每个样品的微生物多样性水平^[21]。测序序列与Greengenes数据库(Release 13.8, <http://greengenes.secondgenome.com>)和Silva数据库(Release115, <http://www.arb-silva.de>)进行比对,找出最接近且可信度达80%以上的种属信息。

1.4 数据处理

利用IBM SPSS Statistics 22.0软件进行统计学分析和数据处理,数据结果以(平均值±标准差)表示;采用SIMCA 14.1软件进行主成分分析(Principal Component Analysis, PCA);基因测序结果已上传至National Center for Biotechnology Information (NCBI)基因数据库(<https://bigd.big.ac.cn/bio->

project),编号为MZ576486和PRJNA691718。

2 结果与分析

2.1 阿曲霉A1的分离鉴定结果分析

将菌株A1测序所得序列与NCBI基因数据库进行比对,选择模式物种进行系统发育树分析,结果如图1所示。由图1可知,菌株A1与*A. amstelodami*聚为一支,故将菌株A1命名为阿曲霉A1(*A. amstelodami* A1)。

图1 菌株A1的ITS核苷酸序列系统发育树

Fig. 1 Strain A1's phylogenetic trees of nucleotide sequences of ITS

2.2 阿曲霉A1纯菌发酵对茶叶感官及特征成分的影响分析

对阿曲霉A1纯菌发酵普洱茶茶样进行感官审评,纯菌发酵茶样的茶汤呈橙红色,滋味醇厚,对照样品的茶汤呈黄绿色,涩味较突出。这表明阿曲霉A1纯菌发酵能改善晒青茶的感官品质,并与普洱茶的感官特征(茶汤呈红褐色、滋味醇厚回甘)相似^[22]。不同茶样中22种茶叶特征成分的聚类热图如图2所示,其中,不同肩标小写字母表示同一种特征成分含量之间具有显著性差异($P < 0.05$)。由图2可知,与对照样品相比,纯菌发酵茶样中茶多酚(TP)和5种儿茶素(GCG、CG、ECG、EGCG、EGC)含量均显著降低($P < 0.05$),促使其茶汤苦涩度降低;而纯菌发酵茶样中茶红素(TR)和茶褐素(TB)含量均显著增加($P < 0.05$),使得其茶汤由黄绿色变为橙红色,这些茶叶特征成分的变化也与传统普洱茶发酵过程中特征成分的变化相似^[23]。由此可以推断,阿曲霉A1对普洱茶的发酵具有积极作用,可将阿曲霉A1接种到晒青茶中进行普洱茶的强化发酵实验。

2.3 阿曲霉 A1 强化发酵对茶叶感官及特征成分的影响分析

自然发酵和强化发酵茶样的感官特征、评分和审评结果见表 1 和图 3, 其中 * 表示自然发酵茶样与强化发酵茶样具有显著性差异 ($P < 0.05$)。由表 1 和图 3 可知, 经自然发酵和强化发酵处理后, 茶样的茶汤均呈红褐色, 滋味醇厚回甘、香气纯正, 但强化发酵茶样的茶汤颜色更深、滋味更醇厚、香气略带怡人的陈香, 且其干茶外形、汤色、滋味、香气和叶底的感官审评分数均显著高于自然发酵茶样 ($P < 0.05$)。由图 3c) 可知, 强化发酵茶样的茶汤其 a^*

值 (24.80 ± 0.65) 和 b^* 值 (76.73 ± 1.38) 均显著高于自然发酵茶样 ($P < 0.05$), 而其 L^* 值 (69.48 ± 0.81) 显著低于自然发酵茶样 ($P < 0.05$), 这进一步说明了强化发酵茶样具有更深的红褐色。结合图 2 可知, 强化发酵茶样中 TB 和 SS 的含量均显著高于自然发酵茶样 ($P < 0.05$), 这与感官审评中强化发酵茶样具有更深的红褐色和更显著的甜味结果一致; 而强化发酵茶样中 C、CA、EC 和 EGC 的含量均显著低于自然发酵茶样 ($P < 0.05$), 验证了强化发酵茶样的苦涩度较自然发酵茶样更低。由此可知, 阿曲霉 A1 强化发酵提高了普洱茶的感官品质。

图 2 不同茶样中 22 种茶叶特征成分的聚类热图

Fig. 2 Cluster heat maps of 22 tea characteristic components in different tea samples

表 1 自然发酵和强化发酵茶样的感官特征及评分

Table 1 Sensory characteristics and scores of natural fermented and enhanced fermented tea samples

茶样	项目	干茶外形	汤色	滋味	香气	叶底
自然发酵	感官特征	条索紧结、匀整, 颜色较红褐, 匀净	红褐明亮	浓醇回甘	香气纯正、浓厚	红褐, 较柔软
	感官评分/分	15.22±1.09	11.44±1.01	20.56±1.51	24.89±1.05	7.11±0.78
强化发酵	感官特征	条索紧结、匀整, 颜色红褐, 匀净	红褐尚亮	醇厚回甘	香气纯正、浓郁, 带有陈香	红褐, 较柔软
	感官评分/分	17.11±1.17*	13.22±1.39*	22.67±1.32*	28.44±0.88*	8.78±0.67*

2.4 阿曲霉 A1 强化发酵茶样微生物群落结构分析

自然发酵和强化发酵茶样的微生物群落丰度及 Alpha 多样性指数见表 2。由表 2 可知,经过 QIIME2.0 软件检查并剔除嵌合体序列等疑问序列后,得到 54 330~77 742 个序列,归类为 503~833 个真菌 OTUs,482~2050 个细菌 OTUs。随着发酵的进

行,强化发酵茶样中微生物群落丰度及 Alpha 多样性指数均增加,但在发酵后期(EF5)均下降,与自然发酵茶样中微生物群落丰度及 Alpha 多样性指数在发酵后期(NF5)仍继续上升形成差异。强化发酵对茶样真菌和细菌群落结构的影响如图 4 和图 5 所示,其中,图 4b)中,C 为微小根毛霉,D 为食腺嘌呤芽生葡萄孢酵母,E 为黑曲霉,F 为 *Brunneoclavispora*

图 3 自然发酵和强化发酵茶样的感官审评结果

Fig. 3 Sensory evaluation of natural fermented and enhanced fermented tea samples

表 2 自然发酵和强化发酵茶样的微生物群落丰度及 Alpha 多样性指数

Table 2 Richness and Alpha diversity indices of microbial communities in natural fermented and enhanced fermented tea samples

微生物类别	茶样	OTUs/个	群落丰度		Alpha 多样性指数	
			ACE 指数	Chao1 指数	Shannon 指数	Simpson 指数
真菌	RM	503±168	619.68±229.42	660.84±214.95	4.14±1.35	0.76±0.25
	NF1	691±140	901.09±113.01	913.28±113.17	4.36±0.64	0.82±0.08
	NF2	833±35	953.14±66.99	944.37±61.03	3.38±0.65	0.68±0.10
	NF3	793±84	977.89±82.71	970.41±82.89	4.26±0.12	0.84±0.01
	NF4	801±16	952.54±34.90	937.10±33.11	3.38±0.30	0.70±0.07
	NF5	833±65	1 011.80±92.53	1 006.33±83.45	3.63±0.71	0.73±0.11
	EF1	512±207	614.74±261.12	635.26±228.56	2.39±0.85	0.56±0.14
	EF2	672±80	810.04±105.20	805.30±94.51	2.93±0.64	0.60±0.18
	EF3	703±288	885.89±248.70	890.09±292.03	3.54±0.54	0.76±0.05
	EF4	809±15	1 027.52±13.07	1 008.95±16.55	3.66±0.24	0.78±0.04
	EF5	542±227	717.34±278.43	723.68±263.96	2.13±0.88	0.47±0.21
细菌	RM	482±81	675.61±181.44	692.98±155.66	5.12±0.15	0.91±0.03
	NF1	755±185	992.75±249.34	1 012.02±242.06	4.80±0.30	0.86±0.02
	NF2	1452±254	1 855.03±330.47	1 854.53±327.64	6.07±0.56	0.94±0.02
	NF3	1349±289	1 744.94±344.72	1 755.63±301.68	6.30±0.11	0.94±0.01
	NF4	1583±364	2 067.56±405.01	2 069.81±433.05	6.66±0.47	0.95±0.02
	NF5	1603±302	2 208.00±355.25	2 158.70±323.00	6.74±0.65	0.95±0.02
	EF1	948±43	1 322.13±109.33	1 322.88±138.61	5.04±1.01	0.86±0.15
	EF2	1500±278	1 971.14±468.62	1 988.60±424.39	6.33±0.75	0.94±0.03
	EF3	1728±93	2 272.03±151.49	2 301.88±141.34	7.37±0.04	0.97±0
	EF4	2050±20	2 760.44±27.85	2 800.57±8.80	7.75±0.39	0.98±0.01
	EF5	1753±319	2 435.24±381.05	2 445.53±353.12	6.91±0.51	0.94±0.04

a) 真菌群落的PCA

b) 真菌种水平群落结构

图4 强化发酵对茶样真菌群落结构的影响

Fig. 4 Effect of enhanced fermentation on fungal communities in tea samples

bambusae, G 为马克斯克鲁维酵母, H 为烟曲霉, I 为 *Paraphysoderma sedebokerense*, J 为疏绵状嗜热丝孢菌, K 为 *Cyberlindnera* sp. RODW5, L 为 *Rogersella griseliniae*, M 为布兰克假丝酵母, N 为 *Endogone corticioides*, O 为阿曲霉, P 为其他真菌; 图 5b) 中, C 为芽孢杆菌, D 为短状杆菌, E 为短杆菌, F 为伯克氏菌, G 为金黄杆菌, H 为肠杆菌, I 为肠球菌, J 为欧文氏菌, K 为埃希氏菌, L 为克雷白氏菌, M 为考克氏菌, N 为甲基杆菌, O 为微杆菌, P 为苍白杆菌, Q 为拟杆菌, R 为假单胞菌, S 为罗尔斯顿菌, T 为鞘氨醇杆菌, U 为葡萄球菌, V 为结核杆菌, W 为 *Xylella*, X 为其他细菌。由图 4a) 和图 5a) 可知, 在发酵过程中, 自然发酵和强化发酵的微生物群落结构发生了动态变化, 且在各个阶段差异显著, 这主要是因为发酵过程中茶样化学成分的不断变化及微生物之间的相互作用(如共生和拮抗作用)^[24]。

由图 4b) 可知, 原料 (RM) 中的优势真菌为

a) 细菌群落的PCA

b) 细菌属水平群落结构

图5 强化发酵对茶样细菌群落结构的影响

Fig. 5 Effect of enhanced fermentation on bacterial communities in tea samples

B. bambusae (41.50%)、黑曲霉 (21.18%) 和马克斯克鲁维酵母 (17.27%)。在强化发酵各阶段中, 均检测到了阿曲霉 (0.01%~0.03%), 但不是优势真菌; 而 *B. bambusae* (41.91%) 是发酵初期 (EF1) 的优势真菌; 随着发酵的进行, 微小根毛霉 (41.68%~66.42%) 迅速生长繁殖, 在发酵中期 (EF2~4) 成为优势真菌; 食腺嘌呤芽生葡萄孢酵母 (72.61%) 在发酵后期 (EF5) 成为优势真菌; 黑曲霉 (8.64%~33.74%) 在整个发酵阶段均为优势真菌。在自然发酵过程中, 黑曲霉始终是优势真菌 (26.64%~37.40%); 此外, 发酵初期 (NF1) 的优势真菌还包括马克斯克鲁维酵母 (31.28%); 随着发酵的进行, 微小根毛霉 (37.48%~61.22%) 迅速繁殖, 与黑曲霉共同成为发酵中后期 (NF2~5) 的优势真菌。由此可知, 虽然在发酵初期将阿曲霉 A1 接种到未经灭菌的晒青茶中进行强化发酵, 但整个发酵过程处于开放状态, 环境中的微生物也会进入发酵系统^[10], 适合在茶叶中生长的微生物就会在这种发酵体系中生长繁殖。

由图 5b)可知, RM 中的优势细菌主要是肠杆菌 (20.94%)、金黄杆菌 (16.65%) 和假单胞菌 (6.90%)。在强化发酵过程中,芽孢杆菌 (39.01%~52.50%) 是发酵前中期 (EF1~3) 的优势细菌;随着发酵的持续进行,葡萄球菌 (12.11%~34.37%) 和芽孢杆菌 (19.63%~37.39%) 共同成为发酵中后期 (EF4~5) 的优势细菌。在自然发酵过程中,发酵前期 (NF1) 的优势细菌主要是埃希氏菌 (32.41%)、克雷白氏菌 (27.41%) 和假单胞菌 (24.54%);芽孢杆菌 (37.07%) 在发酵中期 (EF3) 成为优势细菌;而在发酵后期 (EF5),埃希氏菌 (16.46%) 再次成为优势细菌。

综上所述,尽管在接种阿曲霉 A1 进行强化发酵过程中,阿曲霉在茶样真菌群落中所占比例有限,但相对自然发酵显著改变了其他微生物的相对丰度,例如增加了 *B. bambusae*、食腺嘌呤芽生葡萄孢酵母、葡萄球菌和芽孢杆菌的相对丰度,降低了黑曲霉、马克斯克鲁维酵母、埃希氏菌、克雷白氏菌和假单胞菌的相对丰度,这也解释了强化发酵茶样的感官及特征成分的变化原因。

3 结论

本文将分离自普洱茶的阿曲霉 A1 接种于灭菌和未灭菌的晒青茶中,分别进行了纯菌发酵和强化发酵,进而分析了发酵茶样的感官特征、化学成分及微生物群落结构。经纯菌发酵后,茶样中茶多酚和 5 种儿茶素含量均显著降低,茶红素和茶褐素含量均显著增加。经强化发酵后,茶样中茶褐素和可溶性多糖含量均显著高于自然发酵,而儿茶素、表儿茶素、表没食子儿茶素和咖啡碱含量均显著降低;茶汤的感官特征也随之发生变化,例如, a^* 值、 b^* 值及干茶外形、汤色、滋味、香气、叶底的感官评分均显著升高, L^* 值显著降低。虽然阿曲霉 A1 在强化发酵的真菌群落中只占很小的比例,但其促使了其他几种主要微生物相对丰度的显著变化,因此,阿曲霉 A1 通过与其他微生物的协同作用改变了普洱茶中茶叶的特征成分,从而提高了普洱茶的感官品质。本研究为改善传统普洱茶发酵工艺提供了新思路,并为后续进行多菌种的普洱茶强化发酵乃至实现普洱茶工业化的控菌发酵起到了一定的推动作用,后续也将对阿曲霉 A1 强化发酵普洱茶的作用机理及安全

性展开进一步研究。

参考文献:

- [1] ZHAO R, CHEN D, WU H L. Effects of Pu-erh ripened tea on hyperuricemic mice studied by serum metabolomics [J]. *Journal of Chromatography B*, 2017, 1068: 149-156.
- [2] CAI X B, HAYASHI S, FANG C Y, et al. Pu'erh tea extract-mediated protection against hepatosteatosis and insulin resistance in mice with diet-induced obesity is associated with the induction of de novo lipogenesis in visceral adipose tissue [J]. *Journal of Gastroenterology*, 2017, 52(12): 1240-1251.
- [3] HUANG F J, ZHENG X J, MA X H, et al. Theabrownin from Pu-erh tea attenuates hypercholesterolemia via modulation of gut microbiota and bile acid metabolism [J]. *Nature Communications*, 2019, 10: 4971.
- [4] ZHAO M, ZHANG D L, SU X Q, et al. An integrated metagenomics/metaproteomics investigation of the microbial communities and enzymes in solid-state fermentation of Pu-erh tea [J]. *Scientific Reports*, 2015, 5: 10117.
- [5] ZHAO M, SU X Q, NIAN B, et al. Integrated meta-omics approaches to understand the microbiome of spontaneous fermentation of traditional Chinese Pu-erh Tea [J]. *Msystems*, 2019, 4(6): e619-e680.
- [6] LONG P P, WEN M C, GRANATO D, et al. Untargeted and targeted metabolomics reveal the chemical characteristic of Pu-erh tea (*Camellia assamica*) during pile-fermentation [J]. *Food Chemistry*, 2020, 311: 125895.
- [7] 王越, 赵文谨, 谢云飞, 等. 强化发酵对诺丽果成分的影响及抗氧化活性研究 [J]. *食品工业科技*, 2020, 41(15): 143-149, 157.
- [8] 吴姝, 李金玲, 龙丽丽, 等. 自然与乳酸菌强化发酵过程中红酸汤品质变化 [J]. *中国酿造*, 2020, 39(10): 75-78.

- [9] 梁名志,陈继伟,王立波,等. 人工接种真菌固态发酵对普洱茶品质和功能的影响[J]. 食品科学,2009,30(21):273-277.
- [10] 庞晓娜. 环境微生物对清香型白酒特征风味物质的影响[D]. 北京:中国农业大学,2018.
- [11] 黄晓宁,刘晶晶,韩北忠,等. 基于酶学特性筛选大曲来源芽孢杆菌用于强化酿酒[J]. 食品科学,2021,42(10):218-224.
- [12] 李玉斌,邓静,吴华昌,等. 3株功能菌在四川保宁醋强化发酵中的应用[J]. 食品科学,2017,38(12):75-82.
- [13] 唐万达,黄振东,万晴,等. 不同发酵茶中优势真菌的分离鉴定及产消化酶活性比较[J]. 中国微生物学杂志,2019,31(10):1140-1146.
- [14] 谢晓晨,唐万达,万晴,等. 不同发酵茶中优势真菌的抗氧化酶活性[J]. 中国微生物学杂志,2020,32(6):637-641,655.
- [15] DONG W Y, SI P F, LIU E K, et al. Influence of film mulching on soil microbial community in a rainfed region of northeastern China[J]. Scientific Reports, 2017, 7:8468.
- [16] 国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会. 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法:GB/T 8313—2018[S]. 北京:中国标准出版社,2018.
- [17] WANG Q P, PENG C X, GONG J S. Effects of enzymatic action on the formation of theabrownin during solid state fermentation of Pu-erh tea [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(13):2412-2418.
- [18] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会. 茶叶感官审评方法:GB/T 23776—2018[S]. 北京:中国标准出版社,2018.
- [19] 胡圆圆,杨云忠,杨亚萍,等. 普洱茶熟茶(散茶)感官品质与内质分析[J]. 食品安全导刊,2021(29):75-76.
- [20] LI P, LIN W F, LIU X, et al. Environmental factors affecting microbiota dynamics during traditional solid-state fermentation of Chinese Daqu starter [J]. Frontiers in Microbiology, 2016, 7:1237.
- [21] LIU K Y, WANG L Y, JIANG B, et al. Effect of inoculation with *Penicillium chrysogenum* on chemical components and fungal communities in fermentation of Pu-erh tea [J]. Food Research International, 2021, 150:110748.
- [22] 白晓丽,张建勇,江和源,等. 普洱熟茶化学成分与品质特性相关性分析[J]. 食品与机械,2017,33(5):50-53.
- [23] 孟宪钰,付亚轩,李明超,等. 普洱熟茶化学成分研究进展[J]. 食品与发酵工业,2019,45(12):285-290.
- [24] CERDA A, EL-BAKRY M, GEA T, et al. Long term enhanced solid-state fermentation: Inoculation strategies for amylase production from soy and bread wastes by *Thermomyces* sp. in a sequential batch operation [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2016, 4(2):2394-2401.

Research on the fermentation of Pu-erh tea through inoculation with *Aspergillus amstelodami*

LIU Kunyi^{1,2}, WANG Liyan¹, AN Jiangshan¹, LUO Hui¹,
WANG Xinghua^{1,3}, MA Yan¹, LYU Caiyou¹, ZHAO Ming¹

1. College of Tea/College of Food Science and Technology/The Key Laboratory of Medicinal Plant Biology of Yunnan Province/National & Local Joint Engineering Research Center on Germplasm Innovation & Utilization of Chinese Medicinal Materials in Southwestern China, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China;

2. College of Wuliangye Technology and Food Engineering, Yibin Vocational and Technical College, Yibin 644003, China;

3. Pu'er Institute of Tea Science, Pu'er 665000, China

Abstract: *Aspergillus amstelodami* A1 isolated from Pu-erh tea was inoculated in sterilized or unsterilized sun-dried

green tea leaves to develop pure culture fermentation and enhanced fermentation (EF) of Pu-erh tea. The results showed that the content of tea polyphenols and five catechins in tea decreased significantly, and the content of thearubigins and theabrownins increased significantly after pure culture fermentation. Compared with natural fermentation, the levels of soluble sugars and theabrownins in EF were significantly higher, whereas the levels of gallic acid, (+)-catechin, (-)-epicatechin, (-)-epigallocatechin and caffeine were significantly lower; the scores of sensory evaluation including appearance, color of infusion, taste, aroma and infused leaves in EF were significantly higher; while the value of a^* and b^* of EF's tea infusion were higher and the value of L^* was lower. *A. amstelodami* A1 didn't become the dominant fungi in EF, while the microbial communities in EF were different from those in NF. Therefore, the enhanced fermentation by inoculation of *A. amstelodami* A1 changed the chemical components of tea leaves through the synergistic effect with other microorganisms, therefore improving the sensory quality of Pu-erh tea.

Key words: Pu-erh tea; *Aspergillus amstelodami*; enhanced fermentation; tea chemical component; microbial community

(责任编辑:杨晓娟)

本刊数字网络传播声明

本刊已许可中国知网,万方数据资源系统,维普网,国家科技学术期刊开放平台,博视网,超星,中国科技论文在线,中教数据库,EBSCOhost, Ulrichs, FSTA 等在其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。其相关著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我刊上述声明。